

PREPARACIÓN COLONOSCOPIA

PICOPREP®

(Picosulfato de Sodio 10mg + Óxido de Magnesio 3.5g + Ácido Cítrico 12g)

TURNO TARDE

CENTRO ENDOSCÓPICO 5^{TO} PISO - LOS MILANOS

Paciente: _____

Fecha y Hora: _____

RECOMENDACIONES

Días antes del examen

- ✓ Suspender tabletas de fierro la semana previa.
- ✓ Consulte con su médico sobre su medicación para control de glucosa / Diabetes.
- ✓ Suspender 5 días antes del examen medicamentos que alteran la coagulación como: Plavix (Clopidogrel), Pradaxa, Coumadina / Warfarina, Heparina, Lovenox, Xarelto o similares.
Si dudas, consulte con su médico al respecto.
- ✓ Tres días antes del examen suspender ingesta de alimentos con semillas, granos integrales, "pepas".



TRAMITES ADMINISTRATIVOS

- ✓ Acudir a su cita 30 minutos antes de la hora programada.
- ✓ La orden de atención de las compañías de Seguro tiene validez por 7 días. Si la fecha de su examen se encuentra fuera de la vigencia, usted deberá obtener un nueva orden de atención médica que a su vez le servirá para la cita de control/resultados.
- ✓ El día de su procedimiento (Centro Endoscópico 5° piso) cancelara:

S/. _____

Este monto es calculado en base al deducible establecido por su compañía de seguros.

- ✓ Si durante su examen endoscópico se encontraran lesiones que ameriten un tratamiento en particular (polipectomía, control de sangrado, etc) habrán costos adicionales, los que le serán indicados después del examen.

PREPARACIÓN

Un día antes del examen

- ✓ **Desayuno:** 1 taza de infusión más 4 galletas de soda.
- ✓ **Almuerzo:** Caldo de pollo con papa y fideos (no verduras).
- ✓ **Cena:** Dieta líquida: Gelatina no roja y sólo caldo (no verduras, no papa, no fideos).

Día del examen

- ✓ **A las 7:00 Am:**
Diluir un sobre de PICOPREP® en una tasa de 150ml de agua fría, luego revuelva el polvo en el líquido por espacio de 3 a 4 minutos (asegúrese que la solución deje de burbujear), y tomar la solución.
- ✓ Luego de tomar PICOPREP®, debe tomar como mínimo 4 vasos (1 Litro) de líquido claro y agregar 1 botella de Gatorade transparente (500ml) durante las siguientes dos horas.
- ✓ **04 HORAS ANTES DEL EXAMEN:**
Diluir un sobre de PICOPREP® en una tasa de 150ml de agua fría, luego revuelva el polvo en el líquido por espacio de 3 a 4 minutos (asegúrese que la solución deje de burbujear), y tomar la solución.
- ✓ Enseguida tomar como mínimo 4 vasos (1 Litro) de agua espaciados cada 15 minutos en la siguiente hora, luego **YA NO CONSUMA NINGUN LIQUIDO O ALIMENTO.**

Si tiene alguna duda puede llamar al Servicio de Gastroenterología o escribirnos



224 - 2224 / 224 - 0971
Anexo 4100/4104/4124



consultas@gastrobasamea.com