

PREPARACIÓN COLONOSCOPIA

POLIETILENGLICOL (17GR C/SOBRE)

TURNO TARDE

CENTRO ENDOSCÓPICO 5^{TO} PISO - LOS MILANOS

BARRIGA SALAZAR
médicos - asociados
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA
www.gastrobasamea.com



Paciente: _____

Fecha y Hora: _____

RECOMENDACIONES

Días antes del examen

- ✓ Consulte con su médico sobre su medicación para control de glucosa / Diabetes.
- ✓ Suspender 5 días antes del examen medicamentos que alteran la coagulación como: Plavix (Clopidogrel), Pradaxa, Coumadina / Warfarina, Heparina, Lovenox, Xarelto o similares.
Si dudas, consulte con su médico al respecto.
- ✓ Tres días antes del examen suspender ingesta de alimentos con semillas, granos integrales, "pepas".



TRAMITES ADMINISTRATIVOS

- ✓ Acudir a su cita 30 minutos antes de la hora programada.
- ✓ La orden de atención de las compañías de Seguro tiene validez por 7 días. Si la fecha de su examen se encuentra fuera de la vigencia, usted deberá obtener un nueva orden de atención médica que a su vez le servirá para la cita de control/resultados.
- ✓ El día de su procedimiento (Centro Endoscópico 5º piso) cancelara:

S/. _____

Este monto es calculado en base al deducible establecido por su compañía de seguros.

- ✓ Si durante su examen endoscópico se encontraran lesiones que ameriten un tratamiento en particular (polipectomía, control de sangrado, etc) habrán costos adicionales, los que le serán indicados después del examen.

PREPARACIÓN

Un día antes del examen

- ✓ Desayuno: 1 taza de infusión, leche o jugo + una porción de pan / tostadas.
- ✓ A partir de mediodía solo podrá ingerir: LÍQUIDOS CLAROS (NO ROJOS).

Medicación:

- ✓ A las 4 pm tomar 2 tab de Dibrolax.
- ✓ A las 6 pm tomar otras 2 tab de Dibrolax.

Día del examen

- ✓ A las 5 am disolver 7 sobres de Polietilenglicol (17gr/sobre) en un litro de Gatorade o similar (no rojo). Tomar el litro preparado en un lapso de una hora.
- ✓ A las 8am disolver 7 sobres de Polietilenglicol (17gr/sobre) en un litro de Gatorade o similar (no rojo). Tomar el litro preparado en un lapso de una hora.
- ✓ Suspender toda ingesta de líquidos 2 horas antes del examen.

Si tiene alguna duda puede llamar al Servicio de Gastroenterología o escribirnos



224 - 2224 / 224 - 0971
Anexo 4100/4104/4124



consultas@gastrobasamea.com